

# კარტოფილის დაცვის სისტემა

კოლორადოს სოჭო და  
სსპა მავნებლები,  
რიზოქტონიოზი

**პრესტიჟი®**  
1 ლ/1ტ.

ფართოფოთლიანი და  
მარცვლოვანი  
სარეპელები

**ზენკორი®**

კულტურის  
აღმოცენებამდე –  
ნიადაგის ტიპი:  
მსუბუქი 0,5-0,75 კგ/ჰა  
საშუალო 0,75-1,0 კგ/ჰა  
მძიმე 1,0-1,5 კგ/ჰა

აღმოცენების  
შემდეგ  
კულტურის 5-10  
სმ. სიმაღლემდე  
–  
0,5 კგ/ჰა

ფიტოფტორა,  
ალტერნარიოზი

**ანტრაკოლი® 2,0 კგ/ჰა ან ტატუ® 3,0 ლ/ჰა**

ფიტოფტორას სანინადმდეგო კონკრეტული წამლობის სქემა, პრეპარატების მონაცდევობა და  
ჯერადობა დამოკიდებულია კლიმატურ პირობებზე

კოლორადოს სოჭო  
და სსპა მავნებლები


**კონფიდორ® მაქსი 0,045-0,050 კგ/ჰა ან კალიფსო® 0,1 ლ/ჰა**

- პრესტიჟის გამოყენების შემთხვევაში ინსექტიციდებით წამლობა ყვავილობის დაწყებამდე საჭირო აღარ არის;  
- მავნებლის ყოველ თაობაზე თითო წამლობა

სქემაში მოცემულია კარტოფილის  
განვითარების ის ფაზები, სადაც  
საჭიროა და დასაშვებია პრეპარატების  
გამოყენება.

შემოთავაზებული რეკომენდაცია  
წარმოადგენს ზოგად სქემას. კონკრეტულ  
შემთხვევაში პრეპარატების შერჩევას,  
წამლობის ვადებს და ჯერადობას  
ადგენს დარგის სპეციალისტი, ადგილობრივი  
პირობების გათვალისწინებით და  
მავნებელ-დაავადებათა გავრცელების  
ინტენსივობის მიხედვით.

სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა ერთ  
ჰა-ზე 300 - 400 ლ.



Bayer CropScience

ბაიერ კროპსაიენსი



პერბიტციდი



ინსექტიციდი



ფუნგიციდი



თხსლის  
შესანამლი