

თავთავიანი კულტურების დაცვის სისტემა

გულაფშუტა, ფესვის
სიღამავლები, სეპტო-
რიოზი, ლაკინოზა

რაქსილი®
0,4 ლ/1ტ.

ფართფოთლიანი
სარეველები

გროდილ® მაქსი 0,09-0,11 ლ/ჰა



ახალი ფორმულაცია

მარცვლოვანი
სარეველები

პუმა® სუპერი 0,8-1,0 ლ/ჰა

თავთავიანი
კულტურების ყველა
ქირითადი დაავადება

ფალკონი® 0,6 ლ/ჰა ან ბაილეტონი® 0,5 კგ/ჰა

მავნე კუსებურა, გუგრაპი
და სხვა მავნებლები

დეცის® პროფი 0,03-0,04 კგ/ჰა

სქემაში მოცემულია თავთავიანი კულტურების განვითარების ის ფაზები, სადაც საჭიროა და დასაშვებია პრეპარატების გამოყენება.

შემოთავაზებული რეკომენდაცია ნარმოადგენს ზოგად სქემას. კონკრეტულ შემთხვევაში პრეპარატების შერჩევას, ნაშლობის ვადებს და ჯერადობას ადგენს დარგის სპეციალისტი, ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით და მაგნებელ-დაავადებათა გაერცელების ინტენსივობის მიხედვით.

სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა ერთ ჰა-ზე 300 – 350 ლ.



Bayer CropScience

ბაიერ კროპსაიენსი



ჰერბიციდი



ინსექტიციდი



ფუნგიციდი



თხსლის
შესანამლი