


პამიდორის დაცვის სისტემა

უჩითილო კულტურა



ჩითილების გადარგვისას

ზენკორი®
0,5-0,7 კგ/ჰა
გადარგვიდან 15-20დღის შემდეგ

კონფიდორ® მაქსი 0,04-0,05 კგ/ჰა
დეცის® პროფი 0,015-0,04 კგ/ჰა

პრევიკური®
2-4 ლ. 0,15%-იანი სამუშაო
ხსნარი 1 მ²-ზე
(ჩითილების მორწყვით)

ანტრაკოლი® 1,5-2,0 კგ/ჰა ან ტატუ® 3,0 ლ/ჰა

ფართაფოთლიანი
და მარცვლოვანი
სარეველები

სხვადასხვა სახის
მავნებლები

ჩითილების მორწყვა
ფესვის სიღამებლების
ინსაექციები

ფიტოფტორა,
ალტერნარიოზი

სქემამო მოცემულია პამიდორის
განვითარების ის ფაზები, სადაც
საჭიროა და დასაშვებია პრეპარატების
გამოყენება.

შემოთავაზებული რეკომენდაცია
წარმოდგენს ზოგად სქემას. კონკრეტულ
შემთხვევაში პრეპარატების შერჩევას,
წამლობის გადებს და ჯერადობას
ადგენს დარგის სპეციალისტი, ადგილობრივი
პირობების გათვალისწინებით და
მაგნებულ-დაავადებათა გაურცელების
ინტენსივობის მიხედვით.

სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა ერთ
ჰა-ზე 300 - 400 ლ.



ჰერბიციდი



ინსექტიციდი



ფუნგიციდი



Bayer CropScience

ბაიერ კროპსაიენსი