

ვაზის დაცვის სისტემა

ტკიპები

ენვიდორი® 0,2-0,4 ლ/ჰა
სეზონის განმავლობაში რეკომენდებულია ენვიდორის მხოლოდ ერთხელ გამოყენება

ვარიანები, ყურძნის ჭია და სხვა მავნებლები

კონფიდორ® მაქსი 0,06-0,08 კგ/ჰა;
დეცის® პროფი 0,05 კგ/ჰა

ჭრაქი, შავი ლაქინოვა

ანტრაკოლი® 2,0-2,5 კგ/ჰა

მელოდი® დ 2,5 კგ/ჰა ან მიკალი® 3,0-4,0 კგ/ჰა

მელოდი® დ 2,5 კგ/ჰა ან მიკალი® 3,0-4,0 კგ/ჰა

მელოდი® დ 2,5 კგ/ჰა ან მიკალი® 3,0-4,0 კგ/ჰა

ანტრაკოლი® 2,0-2,5 კგ/ჰა

ნაცარი

ბაილეტონი® 0,2-0,3 კგ/ჰა

ზატო® 0,15 კგ/ჰა

ზატო® 0,15 კგ/ჰა

ფალკონი® 0,3 ლ/ჰა

ნაცრისფერი სიღამკლე

ეუპარენ® მულტი 2,0 კგ/ჰა

სქემაში მოცემულია ვაზის განვითარების ის ფაზები, სადაც დასაშვებია პრეპარატების გამოყენება. შემოთავაზებული რეკომენდაცია წარმოადგენს ზოგად სქემას. კონკრეტულ შემთხვევაში პრეპარატების შერჩევას, წამლობის ვადებს და ჯერადობას ადგენს დარვის სპეცილისტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, მავნებელ-დაავადებათა გავრცელების ინტენსივობას, დაზიანების ხარისხს და სხვა სპეციალურ თავისებურებებს.



კვირტების დაბერვა 2-3 ფოთლის ფაზა

4-5 ფოთლის ფაზა

თანაყვავილედის ჩაჩის ცვენა

ყვავილობის დასაწყისი

ყვავილობის დასასრული

მარცვლის ჩამოყალიბება – მარცვლის ზრდის დასასრული

სრული სიმწიფე

სამუშაო სსნარის ხარჯვის ნორმა ერთ ჰა-ზე 800-1000 ლ.



ინსექტიციდი



ფუნგიციდი



Bayer CropScience

ბაიერ კროპსაიენსი