

თესლოვანი ხეხილის დაცვის სისტემა

მანადე ჩრჩილი

ვაშლის ყვავილქამია,
კოპრიქამია ცხვირბრქალა

ბუბრები, კალიფორნიის
ფარიანა, ფოთლისქვეპია

ვაშლის ნაყოფქამია,
ხარხიანი

ტქიპები

ნაყოფის
სიდაქვეპია

ქატი,
ნაცარი

სქემაში მოცემულია თესლოვანი ხეხილის განვითარების ის ფაზები, სადაც დანაშეგნა პრეპარატების გამოყენება. შემოთავაზებული რეკომენდაცია ნარმოადგენს ზოგად სქემას. კონკრეტულ შემთხვევაში პრეპარატების შერჩევას, ნამლობის ვადებს და ჯერადობას ადგენს დარგის სპეცი-ალისტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, მავნებელ-დაავადებათა გავრცელების ინტენსი-ვობას, დაზიანების ხარისხს და სხვა სპეციალურ თავისებურებებს. დაუშვებელია ნამლობის ჩატარება ყვავილობის პერიოდში თუ იგი განსაკუთრებულ აუცილებლობას არ ნარმოადგენს.

სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა ერთ ჰა-ზე 800-1000 ლ.

კალიფსო® 0,2-0,25 ლ/ჰა;
კონფიდორ® მაქსი 0,07-0,1 კგ/ჰა

დეცის® პროფი 0,05-0,1 კგ/ჰა;
კალიფსო® 0,2-0,25 ლ/ჰა;
კონფიდორ® მაქსი 0,07-0,1 კგ/ჰა

დეცის® პროფი 0,05-0,1 კგ/ჰა; კალიფსო® 0,2-0,25 ლ/ჰა;
კონფიდორ® მაქსი 0,07-0,1 კგ/ჰა

დეცის® პროფი 0,05-0,1 კგ/ჰა;
კალიფსო® 0,2-0,25 ლ/ჰა

ენვიდორი® 0,2-0,4 ლ/ჰა

რეკომენდებულია სეზონის განმავლობაში
ენვიდორის მხოლოდ ერთხელ გამოყენება

ეუპარენ® მ
2,0კგ/ჰა;
ზატო® 0,14 კგ/ჰა

ანტრაკოლი®
2,0-2,5 კგ/ჰა
ბაილეთონი®
0,2-0,3 კგ/ჰა

ბაიკორი®
0,25-0,5
ლ/ჰა

ზატო®
0,14
კგ/ჰა

ზატო®
0,14
კგ/ჰა

ბაიკორი®
0,25-0,5
ლ/ჰა

ანტრაკოლი® 2,0-2,5 კგ/ჰა
ბაილეთონი® 0,2-0,3 კგ/ჰა
2-3 ნამლობა საჭიროებისამებრ



მწვანე
კონუსი

კოკრების
გამოჩენა

კოკრების
განცალკეეება

კოკრების
გავარდისფერება

ყვავილობა

გვირგვინის
ფურცლების
ცვენა

ნასკვი
1,5 სმ-მდე

ნასკვი
3 სმ-მდე

ნასკვი
3 სმ-ზე მეტი

სიმწიფე



ინსექტიციდი



ფუნგიციდი



Bayer CropScience

ბაიერ კროპსაიენსი