


# ანტრაკოლი®

მაღალეფექტური, კონტაქტური მოქმედების საბაზისო ფუნგიციდი ვაზის, კარტოფილის, პამიდორის და ხენილოვან კულტურებში სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად



კულტურა	მოქმედების სპექტრი	ხარჯვის ნორმა	ლოდინის პერიოდი
ვაშლი	ქეცი	2,0-3,0 კგ/ჰა	10 დღე
ატამი	ფოთლების სიხუჭუჭე	3,0 კგ/ჰა	10 დღე
ვაზი	ჭრაქი, შავი ლაქიანობა	2,0-2,5 კგ/ჰა	40 დღე
ციტრუსები	ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ობი, მეჭეჭიანობა	5,0-6,0 კგ/ჰა	—
კარტოფილი	ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი	1,5-2,5 კგ/ჰა	7 დღე
პამიდორი	ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი	1,5-2,0 კგ/ჰა	7 დღე
კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	1,5-2,0 კგ/ჰა	7 დღე
ბალჩეული კულტურები (საზამთრო, ნესვი)	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	1,5-2,5 კგ/ჰა	7 დღე
თამბაქო	ჭრაქი, ალტერნარიოზი	1,5-2,0 კგ/ჰა	—

მოქმედი ნივთიერება	პროპინები, 700 გ/კგ.
პრეპარატიული ფორმა	სველებადი ფხვნილი
შეფუთვა	15 კგ.



Bayer CropScience

ბაიერ კროპსაიენსი